



accoppiamento, da Aspöck U. & H., 1999

ali, da Ward, 1970

Specie dalla biologia solo superficialmente conosciuta, sviluppo correlato a Cupressacee; adulti raccolti tra 0 e 1000 m s.l.m. con periodo di volo tra maggio e luglio (Aspöck et al., 1980).

Stadio preimmaginali: Ward, 1970. **Specie predate:** *Carulaspis juniperi* (Homoptera Diaspididae) su ginepro (Canard, 2001).

Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: da 2 a 2,8 mm. (Aspöck et al., 1980).

Distribuzione regionale italiana:

Liguria; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:

Monserrat, 1980; Aspöck et al., 1980; De Marzo et al., 1992, 1998; Divietri, 1993; Duelli, 1994; Monserrat, 1994a; Pantaleoni, 1994a; Bernardi Iori et al., 1995; Lo Verde et al., 1997; Güsten, 1998; Cesaroni, 2007; Badano, 2008c; Badano & Letardi, 2010; Loru et al., 2011;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](#).