

*Aleuropteryx loewii* Klapalek, 1894



Adulto (foto Ben Hamers, 2007)

Specie dalla biologia solo superficialmente conosciuta, sviluppo correlato a conifere, con spiccata preferenza per *Pinus* sp.; adulti raccolti tra 0 e 1800 m s.l.m. con periodo di volo tra maggio e agosto (Aspöck et al., 1980).

**Stadio preimmaginali:** Rousset, 1966. **Specie predate:** *Leucaspis pini* (Homoptera Diaspididae) su pino (Canard, 2001).

Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: da 2,5 a 3,4 mm. (Aspöck et al., 1980).

**Distribuzione regionale italiana:**

Lombardia; Trentino Alto-Adige; Basilicata; Calabria; Sicilia.

**Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:**

Aspöck et al., 1980; Divietri, 1993; Nicoli Aldini, 1994; Gepp et al., 1994; Hellrigl et al., 1996; Nicoli Aldini & Baviera, 2001;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/).