


***Chrysoperla lucasina* (Lacroix, 1912)**



Coppia in Baviera, 2009



in Noh & Henry, 2010

Specie comune appartenente al gruppo *carnea*, solo di recente definita tassonomicamente (Henry et al., 1996). In Italia prevalente nello strato erbaceo, meno comune sulla vegetazione arborea, dove viene sostituito generalmente da *C.pallida* e/o *C.agilis*.

Suono precopula: <http://www.eeb.uconn.edu/people/cherry/Lucalong.wav>

Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: da 10 a 13 mm.

Distribuzione regionale italiana:

Valle d'Aosta; Piemonte; Lombardia; Trentino Alto Adige; Veneto; Friuli Venezia Giulia; Liguria?; Emilia Romagna; Toscana (e isola d'Elba?); Marche; Lazio; Molise?; Campania; Puglia; Calabria; Sicilia; Sardegna (compresa isola di Asinara).

Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:

Duelli et al., 1996; Henry et al., 1996; Letardi, 1994b, 1998b, 2007a, 2015; Letardi & Migliaccio, 2000; Pantaleoni, 2001; Longo et al., 2001; Letardi et al., 2002; Letardi & Maltzeff, 2001; Viglioglia, 2004; Letardi & Biscaccianti, 2005; Thierry et al., 2005; Nicoli Aldini, 2005b; Canard et al., 2006; Molinu et al., 2007; Balocchi, 2007 (?); Cesaroni, 2007; Barraco, 2008a; Badano, 2008c?; G.S., 2009b (?); Baviera, 2009 (?); Forbicioni, 2010e?: Galliani, 2010b; Gigli, 2010a; Letardi et al., 2010; Muscarella, 2010; Doneddu, 2011a; Risoldi, 2011b; Canu, 2012b; Bondini, 2013a; AAVV, 2014a, 2014b, 2015b?; AAVV, 2016a;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/it/).