

Chrysoperla mediterranea (Hölzel, 1972)




Adulto da Tato, 2008



Uovo da Aspöck., 2007

Specie assai poco nota, di difficile discriminazione, legata alle conifere del genere *Pinus* (Aspöck et al., 1980; Duelli, 1987). L'unica cattura nota in Romagna è stata effettuata su Abete rosso (Pantaleoni, 1988). Presente dal livello del mare sino, in area sud-europea, ai 1200 m (Aspöck et al., 1980).



in Noh & Henry, 2010

Stadi preimmaginali: praticamente sconosciuti.

Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: da 9 a 12 mm.; gli adulti si trovano in natura tra marzo e ottobre (Aspöck et al., 1980).

Distribuzione regionale italiana: Liguria; Emilia Romagna, Abruzzo(?), Sicilia, Sardegna.

Pubblicazioni che citano questa specie in Italia: Monserrat, 1980; Pantaleoni, 1988, 1994a, 2001; Duelli, 1994; Bernardi Iori et al., 1995; Duelli et al., 1996; Pantaleoni & Letardi, 1998; Henry et al., 1999; Nicoli Aldini & Baviera, 2001; Canard et al., 2006; Letardi & Biscaccianti, 2007(?); Cesaroni, 2007; Tato, 2008?; Letardi et al., 2008; Badano, 2008c; Badano & Letardi, 2010;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](#).