


Chrysoperla pallida Henry et al., 2002



Adulto foto Casnati



in Noh & Henry, 2010

Adulto in livrea invernale dal [web](#)



Specie comune appartenente al gruppo carnea, solo da poco descritta (Henry et al., 2002).
Preferenzialmente legata allo strato arboreo.

Suono precopula: http://www.eeb.uconn.edu/people/chenry/Cc2_feml.wav

Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: da 10 a 13 mm.

Distribuzione regionale italiana:

Piemonte; Lombardia; Friuli Venezia Giulia; Liguria?; Emilia Romagna; Toscana (compresa isola d'Elba); Marche; Lazio; Abruzzo; Campania; Basilicata; Puglia; Sicilia; Sardegna (compresa isola di Asinara).

Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:

Duelli et al., 1996; Letardi, 1994b, 2015; Letardi & Migliaccio, 2000; Pantaleoni, 2001; Letardi & Maltzeff, 2001; Henry et al., 2002; Letardi et al., 2002; Baldacchino, 2004; Letardi & Biscaccianti, 2005; Thierry et al., 2005; Caiazza, 2006 ?; Cesaroni, 2007; Tabilio & Letardi, 2008; Casnati & Scherini, 2008; Puma, 2008a; Letardi & Maltzeff, 2008; Badano, 2008c ?; Sechi, 2009f; Fontanesi, 2009a; Carotti et al., 2009; Galliani, 2009f; Gropelli, 2009?; Colacurcio, 2010a; Degni, 2010; De Pascale, 2010; Fontanesi, 2010c; Letardi et al., 2010; Paglialonga, 2010s; Bosi, 2011; G., 2011; Loru et al., 2011; Thierry et al., 2011; Demma, 2012; Minicò, 2012; Morelli, 2012c; Anonimo, 2013b; Medici, 2013d; AAVV, 2014b; AAVV, 2015a, b; Baldacchino et alii 2016; AAVV, 2016a,b;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia.](#)