

*Chrysopidia ciliata* (Wesmael, 1841)



bozzolo da Gepp J., 1999



adulto da Wachmann e Saure., 1997

Specie legata alle latifoglie di biotopi umidi e freschi (Aspöck et al., 1980).

Larva da Castiglioni., 2010

**Stadi preimmaginali:**

Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: da 11 a 17 mm.; gli adulti si trovano in natura tra aprile e settembre; stadio di svernamento: prepupa; parassiti delle larve: *Helorus corruscus* (Pschorn-Walcher, 1971; Aspöck et al., 1980).

**Distribuzione regionale italiana:**

Piemonte; Lombardia; Trentino Alto-Adige; Veneto; Friuli Venezia-Giulia; Emilia Romagna; Lazio.

**Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:**

Rossi, 1790; Tacchetti, 1861; Bettoni, 1884; Massalongo, 1891 ? , 1896 (?); Navás, 1933; Principi, 1956a; Aspöck, 1963a; Eglin-Dederding, 1967; Minelli et al., 1979; Aspöck et al., 1980; Monserrat, 1980; Pantaleoni et al., 1984; Pantaleoni, 1988; Minelli et al., 1993; Nicoli Aldini, 1994; Letardi & Pantaleoni, 1996; Letardi & Migliaccio, 2000; Canard et al., 2006; Castiglioni, 2010; Grazioli, 2012; AAVV, 2015b, AAVV, 2018a;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia.](#)