

***Coniopteryx haematica* MacLachlan, 1868**



Coniopteryx sp. da Flickr.com

Specie dall'ecologia scarsamente conosciuta, è presente sempre in basse densità di popolazione su latifoglie, prevalentemente di tipo arbustivo, in biotopi caldo-secchi.

I pochi dati sulla fenologia della specie forniscono indicazioni sul periodo di volo delle immagini compreso tra maggio e settembre, e sul numero di generazioni annuali dubitativamente fissato in 2 (Aspöck et al, 1980). È presente in natura allo stato adulto da maggio ad agosto.

Stadi preimmaginali: sconosciuti.

Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: da 1,7 a 2,2 mm. (Aspöck et al., 1980).

Distribuzione regionale italiana:

Trentino Alto Adige; Veneto; Liguria; Emilia Romagna; Toscana; Lazio; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:

Aspöck et alii 1980; Monserrat, 1980, 1994a; Pantaleoni, 1982, 1986b, 1988, 1989b, 1990c, 1994a, 1995; Pantaleoni & Sproccati, 1987; Nicoli et alii 1988; Divietri, 1993; Bernardi Iori et al., 1995; Lo Verde et al., 1997; Letardi, 1998b; Nicoli Aldini & Baviera, 2001; Letardi & Maltzeff, 2001; Letardi et al., 2002; Cesaroni, 2007; Badano, 2008c; Badano & Letardi, 2010; Loru et al., 2011;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](#).