

***Coniopteryx lentiae* Aspöck et Aspöck, 1964**



Coniopteryx sp. da Flickr.com

Specie dall'ecologia praticamente ignota, presente sulle latifoglie (*Quercus*, *Carpinus*, *Crataegus*); raccolta in aree chiuse ed umide tra i 300 e i 1700 m. (Aspöck et al, 1980; Loru et al., 2011). È presente in natura allo stato adulto da marzo a novembre.

Stadi preimmaginali: sconosciuti.

Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: da 2,0 a 2,9 mm. (Aspöck et al., 1980).

Distribuzione regionale italiana:

Lombardia; Liguria, Emilia Romagna; Toscana (?); Umbria; Marche; Lazio; Abruzzo?; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:

Monserrat, 1980, 1981, 1994a; Eglin-Dederding, 1967; Aspöck et al., 1980; Divietri, 1993; Nicoli Aldini, 1994, 2012; Pantaleoni, 1995; Bernardi Iori et al., 1995(?); Meinander, 1998; Lo Verde et al., 1997; Letardi, 1998b, 2015; Longo et al., 2001; Letardi & Nicoli Aldini, 2007; Cesaroni, 2007; Badano, 2008c; Badano & Letardi, 2010; Loru et al., 2011;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/).