

***Cunctochrysa baetica* (Hölzel, 1972)**



adulto foto A.Letardi 2016

Specie legata ad ambienti mediterranei caldo secchi tra il livello del mare e i 1500 m. circa. Periodo di volo tra aprile e settembre.

**Stadi preimmaginali: .**

Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: da 7,5 a 11 mm. (Aspöck et al., 1980).

**Distribuzione regionale italiana:**

Trentino Alto-Adige; Veneto; Liguria; Emilia Romagna; Lazio; Campania; Sardegna.

**Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:**

Grandi, 1957; Hölzel, 1972; Hölzel & Ohm, 1972; Aspöck et al., 1980; Monserrat, 1980, 2008; Pantaleoni, 1982, 1984, 1986b, 1988, 1990a, 1994a, 1995; Bullini et al., 1983; Pantaleoni et al., 1993; Bernardi Iori et al., 1995; Letardi, 1998b; Pantaleoni & Letardi, 1998; Letardi & Migliaccio, 2000 (?); Letardi & Maltzeff, 2001; Canard et al., 2006; Cesaroni, 2007; Badano, 2008c; Badano & Letardi, 2010;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/).