

Pseudomallada clathratus (Schneider, 1845)



adulto da Niolu, 2007c

Specie meridionale legata alle latifoglie degli strati arboreo ed arbustivo, mostra una certa preferenza per Olivi, Salici (spesso presente sui saliceti delle sponde fluviali) ed altre essenze, ma le sue esigenze ecologiche devono ancora essere chiarite (Principi, 1956; Aspöck et al, 1980), la preferenza per piante dal fogliame verde-glaucò (olivi, salici, ecc.) è dovuta probabilmente al fattore mimetismo. Raccolta in pochi esemplari ai bordi dei tratti di bosco più denso e fresco. Probabilmente bi- o trivoltina, è presente in natura allo stato adulto da maggio al pieno autunno. Sverna allo stadio larvale.

Stadi preimmaginali: Principi, 1956. **Parassitoidi degli adulti:** *Chrysopophthorus* sp. (Hymenoptera).

Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: da 9 a 12 mm. (Aspöck et al., 1980).

Distribuzione regionale italiana:

Presente in quasi tutte le regioni italiane (compresa l'isola di Asinara e Montecristo) ad eccezione di Veneto, Friuli e Basilicata.

Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:

Schneider, 1845, 1851; Hagen, 1860a,b; Costa, 1855, 1884b; Brauer, 1876; Navás, 1906, 1915d, 1927b, 1932; Grandi, 1955, 1957; Principi, 1956a; Castellani, 1957; Aspöck et al., 1980; Monserrat, 1980; Insom et al., 1985; Pantaleoni et al., 1985b, 1990b; Pantaleoni, 1986a, 1988, 1990a; Liber et al., 1988; Sgobba, 1991; Divietri, 1993 (?); Principi et al., 1994; Duelli, 1994; Nicoli Aldini, 1994; Bernardi Iori et al., 1995; Letardi & Pantaleoni, 1996; Pantaleoni & Letardi, 1997, 1998; Letardi, 1998b, 2015; Nicoli Aldini & Baviera, 2001; Longo et al., 2001; Badano, 2006b; Canard et al., 2006; Molinu et al., 2007; Niolu, 2007c; Letardi & Nicoli Aldini, 2007; Cesaroni, 2007; Monserrat, 2008; Letardi & Maltzeff, 2008; Badano, 2008c; Labriola, 2009c; Zafarana, 2009b; Fiaschi, 2010c; Badano & Letardi, 2010; Barraco, 2011d; Letardi & Badano, 2018;



allo stesso modo - 2.5 - Italia.