

***Fibla maclachlani* (Albarda, 1891)**



Esemplare adulto ♀ Foto Pinna



Larva adulta foto Bazzato 2007



Esemplare adulto ♀ Foto Pinna

Specie con larve subcorticole; adulti raccolti tra i 150 e i 1600 m s.l.m. prevalentemente su *Pinus* ma anche su *Quercus* ed altre essenze arboree. Specie estremamente euriecia anche se molto localizzata, con periodo di volo tra aprile e giugno (Aspöck et al., 1991). Gli adulti non si nutrono (Loru et al., 2011).

Stadio di svernamento: larva. **Parassitoidi:** *Nemeritis caudatula* Thoms.

Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: da 9 a 13 mm. (Aspöck et al., 1991).

Distribuzione regionale italiana:

Toscana?; Sicilia, Sardegna

Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:

Rambur, 1842 (?); Costa, 1884b (?); Brauer, 1876; Albarda, 1891; De Carlini, 1885 (?); Acloque, 1897; Griffini, 1897 (?); Esben-Petersen, 1913; Navás, 1915f, 1918, 1928a, 1934a; Grandi, 1957; Aspöck et al., 1966, 1980, 1991; Kimmins, 1970; Pantaleoni, 1990d; Letardi, 1994a, 1994c; Bernardi Iori et al., 1995; Pantaleoni & Letardi, 1998; Nicoli Aldini & Baviera, 2001; Longo et al., 2001; Sechi, 2007; Morelli & Romano, 2007; Bazzato, 2007; Aspöck U. & H., 2007; Cavalli, 2007; Cesaroni, 2007; Niolu, 2008a; Puma, 2008a; Aspöck H. et U., 2009; Muscarella, 2010b, o(?); Rattu, 2010a,c; Altadonna, 2011c; Barraco, 2011a; Haring et al., 2011; Loru et al., 2011; Murgia, 2011; Nicoli Aldini et al., 2012; Rattu A., 2013a; AAVV, 2015a; AAVV, 2016a;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](#).