

***Hemerobius gilvus* Stein, 1863**



adulto foto ©Rinaldo Nicoli Aldini

Specie turanico-europea legata probabilmente a boschi di latifoglie con netta preferenza per il genere *Quercus*, in ambienti caldo asciutti, sino a quote collinari (Aspöck et al, 1980). Presente in natura allo stato adulto da aprile a settembre.

Stadi preimmaginali: non ancora descritti.

Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: da 6 a 9,5 mm. (Aspöck et al., 1980).

Distribuzione regionale italiana:

Quasi tutte le regioni ad eccezione di Valle D'Aosta; Piemonte; Friuli Venezia Giulia; Calabria; Sardegna.

Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:

Grandi, 1957; Aspöck, 1963a; Zangheri, 1966; Aspöck et al., 1969, 1980; Monserrat, 1980, 1991, 2004; Pantaleoni, 1984, 1986b, 1988, 1990a, 1990d; Divietri, 1993; Minelli et al., 1993; Nicoli Aldini, 1994; Bernardi Iori et al., 1995; Hellrigl et al., 1996; Letardi & Pantaleoni, 1996; Letardi, 1998b; Letardi & Migliaccio, 2000; Nicoli Aldini & Baviera, 2001; Letardi & Biscaccianti, 2005; Badano, 2006b; Cesaroni, 2007; Badano, 2008c; Badano & Letardi, 2010; AAVV, 2014b;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/).