

***Hemerobius handschini* Tjeder, 1957**



adulto foto Badano

Specie sudeuropea legata probabilmente a boschi di conifere con netta preferenza per il genere *Pinus*, in ambienti caldo asciutti, con elevate densità di popolazione sui versanti boscati esposti a Sud (Aspöck et al, 1980). Presente in natura allo stato adulto da (aprile) maggio a settembre.

**Stadi preimmaginali:** non ancora descritti.

Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: da 5,5 a 8 mm. (Aspöck et al., 1980).

**Distribuzione regionale italiana:**

Quasi tutte le regioni ad eccezione di Valle D'Aosta; Umbria; Puglia e Sardegna.

**Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:**

Tjeder, 1957; Aspöck, 1962a; Aspöck et al., 1980; Pantaleoni, 1984, 1986b, 1988, 1990a; Nicoli Aldini, 1994; Bernardi Iori et al., 1995; Letardi & Pantaleoni, 1996; Letardi & Migliaccio, 2000; Nicoli Aldini & Baviera, 2001; Monserrat, 2004; Letardi & Cristofaro, 2005; Letardi & Biscaccianti, 2005; Letardi, 2007a; Letardi & Nicoli Aldini, 2007; Letardi & Maltzeff, 2008; Badano, 2008c; Carotti et al, 2009; Badano & Letardi, 2010; Gigli, 2010!; Letardi et al., 2010; Letardi & Scalercio, 2018;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).