

## *Hemerobius pini* Stephens, 1836



Adulto da Wachmann e Saure, 1997

Specie esclusiva delle Conifere con una certa preferenza, nonostante il nome, per gli Abeti (Aspöck et al., 1980).  
In particolare, in impianti monocolturali di *Picea* sp. svolge un ruolo importante

**Stadi preimmaginali:** Killington, 1937.

Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: da 6 a 9 mm.; gli adulti si trovano in natura tra aprile/maggio e settembre/ottobre; parassiti delle larve: *Anacharis* spp. (Aspöck H., Aspöck U., Hölzel U., 1980).

**Distribuzione regionale italiana:**

Valle d'Aosta; Piemonte ?; Lombardia; Trentino Alto-Adige; Veneto; Friuli Venezia Giulia; Emilia Romagna.

**Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:**

Minelli, 1977; Aspöck et al., 1980; Monserrat, 1980, 1991; Pantaleoni, 1988, 1990c; Nicoli Aldini, 1994; Hellrigl et al., 1996;



larva da Aspöck U. & H., 1999

come predatore di afidi come gli Adelgidae (Stelzl & Devetak, 1999).

Due generazioni annuali, con periodo di volo tra fine Aprile e fine Settembre, con massimo tra giugno e Agosto.