

Hemerobius stigma Stephens, 1836



Adulto da Wachmann e Saure, 1997

Specie legata esclusivamente alle Conifere ed in particolar modo a *Pinus* sp. (Aspöck et al., 1980) su cui preda *Matsucoccus* sp. (Homoptera Matsucoccidae). Svernante anche allo stato adulto, la si rinviene durante tutto l'anno (Pantaleoni, 1988).

Stadi preimmaginali: Killington, 1937.

Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: da 6 a 8.5 mm.; gli adulti si trovano in natura tutto l'anno; stadio di svernamento: prepupa o immagine; parassiti delle larve: *Anacharis* spp. (Anacharidae), *Hemiteles* spp., *Gelis* spp. (Ichneumonidae) (Aspöck H., Aspöck U., Hölzel U., 1980).

Distribuzione regionale italiana:

Piemonte; Lombardia; Trentino Alto-Adige; Veneto; Friuli Venezia-Giulia; Liguria; Emilia Romagna; Toscana; Lazio; Abruzzo; Molise; Basilicata; Calabria; Sardegna.

Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:

Brauer, 1876; Aspöck, 1963a; Schmid, 1972; Aspöck et al., 1980; Monserrat, 1980, 1991; Pantaleoni, 1982, 1986b, 1988, 1990a,c; Covassi et al., 1991; Divietri, 1993; Pantaleoni et al., 1994; Nicoli Aldini, 1994; Bernardi Iori et al., 1995; Hellrigl et al., 1996; Pantaleoni & Letardi, 1998; Letardi & Migliaccio, 2000; Binazzi et al., 2004; Monserrat, 2004; Mendel et al., 2004; Branco et al., 2006; Molinu et al., 2007; Letardi, 2007; Letardi & Nicoli Aldini, 2007; Letardi & Maltzef, 2008; Badano, 2008c; Badano & Letardi, 2010; Morin, 2010c; Sechi, 2010b; AAVV, 2014a, 2015b; Letardi & Scalercio, 2018;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/).