

***Italoraphidia solariana* (Navás, 1928)**



Specie la cui ecologia è ancora largamente sconosciuta, a larve presumibilmente terricole, in zone boscate tra i 1000 e i 1600 m di quota (Aspöck et al., 1991).
Specie semivoltina (Aspöck et al., 1991).

Femmina, da Aspöck, 2007

Locus typicus: Monte Sacro (Gelbison, Cilento, Campania)

Stadi preimmaginali: Aspöck et al., 1991. Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: M da 9,5 a 10,8 mm., F da 10 a 12 mm.; gli adulti si trovano in natura tra (aprile) giugno e luglio (agosto) (Aspöck et al., 1991). **Stadio di svernamento**: larva.

Distribuzione regionale italiana: Campania; Basilicata, Calabria.

Publicazioni che citano questa specie in Italia:

Navás, 1928a, 1934a; Principi, 1952, 1961, 1966; Aspöck et al., 1980, 1991; Pantaleoni, 1986a, 1990c; Poggi, 1993; Divietri, 1993; Letardi & Pantaleoni, 1996; Güsten, 1998; Letardi, 1998b; Pantaleoni & Letardi, 1998; Rausch et al., 2004; Aspöck U. et H., 2007; Aspöck H. et U., 2009; Haring et al., 2011;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/).