

***Megalomus tineoides* Rambur, 1842**



adulto foto I. Martinez 2009

Specie le cui esigenze ecologiche devono ancora essere chiarite.

Stadi preimmaginali: non ancora descritti.

Due probabili generazioni annuali, volo degli adulti tra maggio e ottobre. Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: da 6 a 7 mm. (Aspöck et al., 1980).

Distribuzione regionale italiana:

Lombardia?; Trentino Alto-Adige; Veneto; Friuli Venezia Giulia?; Liguria; Emilia Romagna; Abruzzo; Molise; Campania?; Basilicata; Puglia; Sicilia; Sardegna.

Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:

Navás, 1930a; Aspöck, 1962b, 1963a; Principi, 1966 (?); Zangheri, 1966; Aspöck et al., 1969, 1980; Pantaleoni, 1988, 1990d, 1990c, 1994a; Divietri, 1993; Monserrat, 1994b; Bernardi Iori et al., 1995; Letardi & Pantaleoni, 1996; Pantaleoni & Letardi, 1998; Letardi & Biscaccianti, 2005; Letardi & Nicoli Aldini, 2007; Cesaroni, 2007; Sechi, 2009d(?), 2009e;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/).