

***Megalomus tortricoides* Rambur, 1842**



Bozzolo da Gepp, 1999

Specie legata quasi esclusivamente alle latifoglie fra le quali mostra una certa preferenza per *Crataegus*, *Prunus*, *Berberis*. Presente dal livello del mare al piano montano. Adulti in volo tra maggio e settembre (Aspöck et al., 1980).

**Stadio di svernamento:** pupa ?

Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: da 7 a 9 mm. (Aspöck et al., 1980).

**Distribuzione regionale italiana:**

Valle d'Aosta; Piemonte; Lombardia; Trentino Alto-Adige; Veneto; Friuli Venezia Giulia; Liguria?; Emilia Romagna; Umbria; Marche; Abruzzo; Molise; Campania

**Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:**

Costa, 1855, 1858; Hagen, 1860a; Principi, 1958; Aspöck, 1962b, 1963a; -Dederding, 1967; Aspöck et alii, 1980; Pantaleoni, 1990c; Cocquemot et al., 1990; Nicoli Aldini, 1994; Monserrat, 1994b; Letardi & Pantaleoni, 1996; Hellrigl et al., 1996; Pantaleoni & Letardi, 1998; & Migliaccio, 2000; Marcuzzi, 2003; Monserrat, 2004; Letardi & Biscaccianti, 2005; Badano, 2008c; AAVV, 2015b;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/it/).