


***Megistopus lucasi* (Navás, 1912)**



Adulto da Badano & al., 2016



Larva da Badano & Pantaleoni, 2014

Specie poco nota segnalata esclusivamente per siti costieri caratterizzati dalla presenza di dune di sabbia ben conservati. Le larve sono state raccolte in prossimità di ginepri isolati su dune aperte, sepolti alla base di ginepri e tra le loro radici. In queste condizioni, il substrato è sempre composto da sabbia pulita, senza cospicue quantità di detriti organici, tranne gli aghi di ginepro. Queste larve sono apparentemente assenti da habitat retrodunali con una vegetazione più fitta (Badano & Pantaleoni, 2014).

**Stadi preimmaginali:** Badano & Pantaleoni, 2014. **Parassitoidi:** *Micomitra stupida* (larva; Dip. Bom.)(Badano et al., 2017)

**Distribuzione regionale italiana:**

Lazio; Sardegna.

**Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:**

Letardi & Pantaleoni, 1996; Letardi & Maltzeff, 2001; Audisio, 2002; Niolu, 2007e; Cesaroni, 2007; Badano & Pantaleoni, 2014; Badano et al., 2017;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/).