

***Micromus paganus* Linnaeus, 1767**



Adulto foto Key On Web

Specie piuttosto euriecia ed euritopa, la si trova prevalentemente negli strati erbacei ed arbustivo in zone di latifoglie, ma anche in giardini e parchi suburbani, dal livello del mare sino al piano montano e, in alcuni casi, a quello subalpino (Aspöck et al., 1980; Plant, 1994).

Stadi preimmaginali: Killington, 1936.

Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: da 8.5 a 11 mm.; gli adulti si trovano in natura tra maggio e ottobre (Aspöck et al., 1980).

Distribuzione regionale italiana:

Valle d'Aosta; Piemonte; Lombardia; Trentino Alto-Adige; Veneto; Friuli Venezia Giulia; Emilia Romagna; Lazio; Abruzzo; Puglia; Calabria; Sicilia.

Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:

A.Costa, 1869; Della Torre, 1882; Heller & Della Torre, 1882; Navás, 1913b, 1929, 1933; Principi, 1966; Eglin-Dederding, 1967; Aspöck et al., 1980; Monserrat, 1980, 1991; Pantaleoni, 1990c; Cocquemot et al., 1990; Nicoli Aldini, 1994; Bernardi Iori et al., 1995; Hellrigl et al., 1996; Pantaleoni & Letardi, 1998; Letardi & Migliaccio, 2000; Letardi et al., 2010;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia.](#)