

Nineta flava (Scopoli, 1763)



Adulto da Aspöck U. & H., 1999

Specie legata alle latifoglie in biotopi fresco-umidi ove può divenire anche molto abbondante (Aspöck *et al.*, 1980). Presente in habitat semi antropizzati quali parchi, giardini e frutteti, l'adulto si nutre di

Stadi preimmaginali: Killington, 1937.

Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: da 16 a 25 mm.; gli adulti si trovano in natura tra maggio e settembre; stadio di svernamento: prepupa; parassiti delle uova: *Telonomus* spp. (Scelionidae); delle larve: *Helorus corruscus* (Heloridae) e *Hemiteles* spp. (Ichneumonidae) (Pschorn-Walcher, 1971; Aspöck *et al.*, 1980).

Distribuzione regionale italiana:

Valle d'Aosta; Piemonte; Lombardia; Trentino Alto-Adige; Veneto; Liguria; Emilia Romagna; Toscana; Abruzzo; Sicilia.

Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:

Lazzarini, 1896; Navás, 1933; Grandi, 1958; Eglin-Dederding, 1967; Aspöck *et al.*, 1980; Monserrat, 1980; Pantaleoni, 1982, 1986b, 1988, 1989b, 1990a,c; Arzone *et al.*, 1985; Insom *et al.*, 1985; Leraut, 1992c; Pantaleoni *et al.*, 1994; Nicoli Aldini, 1994; Bernardi Iori *et al.*, 1995; Hellrigl *et al.*, 1996; Canard *et al.*, 1998; Pantaleoni & Letardi, 1998; Canard *et al.*, 2006; Monserrat, 2008; Badano & Letardi, 2010; Letardi *et al.*, 2010; Melchiori, 2010; AAVV, 2016b;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](#).