

Nineta pallida (Schneider, 1851)



adulto foto Badano D.

Infeudata esclusivamente su conifere (Ohm, 1973; Aspöck et al., 1980). Le catture in Romagna mostrano una certa predilezione per l'Abete bianco nonostante la specie sia frequentemente citata per *Picea* (Pantaleoni, 1988).

Monovoltina a volo tardivo, fine luglio - ottobre, sverna, unico caso conosciuto fra i Crisopidi, allo stato di larva di I età (Canard, 1985).

Stadi preimmaginali: Brauer, 1867.

Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: da 17 a 24 mm. (Aspöck et al., 1980).

Distribuzione regionale italiana:

Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino Alto-Adige; Veneto; Friuli Venezia-Giulia; Liguria; Emilia Romagna; Toscana; Basilicata; Calabria.

Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:

Navás, 1913b; Zangheri, 1966; Aspöck et al., 1980; Monserrat, 1980; Pantaleoni, 1988, 1990a,c,d; Leraut, 1992c; Divietri, 1993; Pantaleoni et al., 1994; Nicoli Aldini, 1994, 2007d; Hellrigl et al., 1996; Canard et al., 1998; Pantaleoni & Letardi, 1998; Zizzari, 2005; Badano, 2008c; Badano & Letardi, 2010; Fontanesi, 2010c; Cortese, 2011e; Letardi & Scalercio, 2018;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/).