

*Parasemidalis fuscipennis* (Reuter, 1894)



Adulto (foto Graham Calow, 2010)

Specie dall'ecologia poco nota, rilevata principalmente ma non esclusivamente su conifere (*Pinus*, *Juniperus*) dal livello del mare ai 700 metri di quota, in Europa tra giugno ed agosto (Aspöck et al., 1980).

**Stadi preimmaginali:** Whitycombe, 1923 (solo le uova).

Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: da 2 a 2,7 mm. (Aspöck et al., 1980).

**Distribuzione regionale italiana:**

Liguria; Emilia Romagna; Toscana; Puglia; Calabria; Sicilia; Sardegna.

**Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:**

Pantaleoni, 1988, 1994a; Aspöck et al., 1980; Divietri, 1993; Bernardi Iori et al., 1995; Lo Verde et al., 1997; Monserrat, 2002; Cesaroni, 2007; Badano, 2008c; Badano & Letardi, 2010; Loru et al., 2011; Letardi & Scalercio, 2018;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/).