

***Phaeostigma galloitalicum* (Aspöck H. & U., 1976)**



Larva, da Aspöck, 2007

Specie a larve subcorticole legate a conifere di ambienti tendenzialmente xerofili, tra i 300 e i 1100 m di quota (Aspöck et al., 1991).

Specie semivoltina (Aspöck et al., 1991).

Locus typicus: Monte Faito (Campania)

Stadi preimmaginali: Aspöck et al., 1991. Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: M da 9,5 a 12,2 mm., F da 10,5 a 11,5 mm.; gli adulti si trovano in natura tra maggio e giugno (Aspöck et al., 1991).

Stadio di svernamento: larva. **Parassitoidi:** *Nemeritis* sp. (iperparassitoidi: *Perilampus polypori*)

Distribuzione regionale italiana: Emilia Romagna; Marche; Lazio; Abruzzo, Molise?; Campania, Puglia.

Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:

Aspöck et al., 1975, 1980, 1991; Pantaleoni, 1988, 1990c; Pantaleoni et al., 1994; Bernardi Iori et al., 1995; Letardi & Pantaleoni, 1996; Pantaleoni & Letardi, 1998; Letardi & Biscaccianti, 2005 ?; Aspöck U. et H., 2007; Carotti et al., 2009; Carotti, 2010b;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/).