

Phaeostigma italogallicum (Aspöck H. & U., 1976)



Femmina di *Phaeostigma* sp. francese, foto Vinz

Specie a larve subcorticole legate a *Abies* sp., *Quercus* sp., *Pinus* sp. di ambienti tendenzialmente xerofili, tra i 500 e i 1500 m di quota (Aspöck et al., 1991).

Specie semivoltina (Aspöck et al., 1991).

Stadi preimmaginali: Aspöck et al., 1991. Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: M da 9,0 a 12,5 mm., F da 11,8 a 13,5 mm.; gli adulti si trovano in natura tra maggio e giugno (Aspöck et al., 1991).

Stadio di svernamento: larva. **Parassitoidi:** *Nemeritis caudatula*, *N. specularis specularis*

Distribuzione regionale italiana: Emilia Romagna; Marche; Abruzzo, Basilicata, Calabria.

Publicazioni che citano questa specie in Italia:

Aspöck et al., 1975, 1980, 1991; Pantaleoni, 1986a (?), 1988, 1990d; Cocquemot et al., 1990; Divietri, 1993; Pantaleoni et al., 1994; Bernardi Iori et al., 1995; Letardi & Pantaleoni, 1996; Güsten, 1998; Pantaleoni & Letardi, 1998; Rausch et al., 2004; Letardi & Biscaccianti, 2007; Haring et al., 2011; Giovagnoli, 2011 (?); Letardi & Scalercio, 2018;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/).