

Phaeostigma major (Burmeister, 1839)



coppia in copula, da Rausch, 2004

Larva presumibilmente esclusivamente subcorticicola su latifoglie (pero, melo, quercie, ed altro) e (a volte) conifere (pino, abete, ginepro); adulti eurieci, presenti in frutteti come predatori di fitofagi, raccolti sino i 700 - 1000 m s.l.m. con periodo di volo tra (aprile) maggio e giugno (luglio) (Aspöck et al., 1991).

Stadio di svernamento: larva. **Parassiti e Parassitoidi:** *Gregarina raphidiae* Ach., *Nemeritis caudatula* Thoms., *Nemeritis specularis specularis* Horstm., *Nemeritis canaliculata* Horstm. e *Nemeritis silvicola* Horstm. **Iperparassitoidi:** *Perilampus polypori* Bouček

Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: da 9,2 a 15 mm. (Aspöck et al., 1991).

Distribuzione regionale italiana:

Sino ad ora non segnalata con certezza per l'Italia

Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:

Sino ad ora non segnalata con certezza per l'Italia



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](#).