

***Subilla confinis* (Stephens, 1836)**



Maschio, dal [web](#)

Specie a larve presumibilmente subcorticole legate a diverse latifoglie (specificatamente *Quercus* sp.) e, in Italia meridionale, a conifere (*Pinus* sp.), ma con una variabilità tale che potrebbe in realtà rappresentare un gruppo di almeno un paio di specie molto simili (Aspöck et al., 1991).

Specie semivoltina (Aspöck et al., 1991).

Stadi preimmaginali: Aspöck et al., 1991. Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: M da 7,5 a 8,5 mm., F da 8,8 a 10,5 mm.; gli adulti si trovano in natura tra maggio e giugno (luglio) (Aspöck et al., 1991). **Stadio di svernamento:** larva. **Parassitoidi:** *Nemeritis* sp. (iperparassitoidi: *Perilampus polypori*)

Distribuzione regionale italiana: Valle d'Aosta?; Trentino Alto-Adige; Friuli Venezia Giulia?; Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

Publicazioni che citano questa specie in Italia:

Costa, 1855; Albarda, 1891; Aspöck et al., 1980, 1991; Hellrigl et al., 1996; Nicoli Aldini et al., 2012;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](#).