

## *Symphorobius luqueti* Leraut, 1991



Specie solo di recente riconosciuta, spesso confusa con *S. pygmaeus* da cui si distingue facilmente avendo le antenne senza le caratteristiche aree chiaroscurate della congenera. La sua ecologia non è ancora stata definita con accuratezza; esemplari sono frequentemente catturati al lume. Probabile preferenza per biotopi caldo-umidi (parchi periurbani, giardini, ecc.) (Pantaleoni, com. pers.).

adulto foto Barraco, 2009

**Stadi preimmaginali:** sconosciuti.

Gli adulti si trovano in natura in Italia peninsulare tra maggio e settembre (Letardi & Maltzeff, 2001).

### **Distribuzione regionale italiana:**

Liguria; Emilia Romagna; Toscana (e isola di Montecristo); Marche?; Lazio; Campania; Basilicata; Calabria; Sicilia (e isole Eolie); Sardegna.

### **Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:**

Divietri, 1993; Sinacori et al., 1994; Pantaleoni, 1995; Bernardi Iori et al., 1995; Letardi & Pantaleoni, 1996; Pantaleoni & Letardi, 1997, 1998; Nicoli Aldini & Baviera, 2001; Longo et al., 2001; Letardi & Maltzeff, 2001; Letardi & Cristofaro, 2005; Cesaroni, 2007; Barraco, 2009f(?), 2009g(?), 2010e; Gigli, 2010e ?, 2012c; Badano, 2011; Loru et al., 2011; Nicoli Aldini et al., 2012; Labriola, 2013a; AAVV., 2017b, 2020b?; Letardi & Scalercio, 2018;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/).