

Tjederiraphidia santuzza Aspöck H., Aspöck U. et Rausch, 1980



Maschio



femmina

larva

pupa

Genere monotipico, endemico dell'Aspromonte, con larve subcorticole legate a conifere (*Abies* sp.), tra i 1500 e i 1700 m (Aspöck et al., 1991).

Specie semivoltina (Aspöck et al., 1991).

Locus typicus: Aspromonte, tra Gambarie e Montaldo (RC, Calabria)

Stadi preimmaginali: Aspöck et al., 1991, foto da Aspöck H.&U., 2009. Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: M da 8,5 a 9,2 mm., F da 8,8 a 10 mm. **Stadio di svernamento:** pupa.

Distribuzione regionale italiana: Calabria.

Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:

Aspöck, Aspöck et Rausch, 1980, 1991; Bernardi Iori et al., 1995; Güsten, 1998; Aspöck H.&U., 2009; Haring et al., 2011; Letardi & Scalercio, 2018;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/).