

***Wesmaelius fassnidgei* (Killington, 1933)**



Adulto di *Wesmaelius sp.* da [www.flickr.com](http://www.flickr.com)

Specie a sviluppo probabilmente legato in modo esclusivo alle conifere, con una chiara preferenza per *Larix sp.*, in ambienti montani o sub-alpini, sino ai 2000 m di quota (Aspöck et al., 1980).

**Stadi preimmaginali:** sconosciuti.

Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: da 8 a 10 mm.; gli adulti si trovano in natura tra (giugno) luglio e settembre (ottobre) (Aspöck et al., 1980).

**Distribuzione regionale italiana:**

Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino Alto Adige; Veneto; Friuli Venezia Giulia?

**Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:**

Aspöck et al., 1980; Leraut, 1992c; Nicoli Aldini, 1994; Pantaleoni & Letardi, 1998; Monserrat, 2004;;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/).