

Wesmaelius nervosus (Fabricius, 1793)



adulto neosfarfallato

dal web

adulto dal web



larva foto Skaftason



pupa in fase farata dal web

Specie che esige biotopi freschi ed umidi all'interno dei quali frequenta sia gli strati arboreo ed arbustivo che quello erbaceo (Killington, 1937; Kis et alii, 1970; Ressler, 1974; Gepp, 1977; Aspöck et al., 1980). Specie complessivamente euriecia, presente dal livello del mare al piano subalpino. Adulti in volo tra aprile e ottobre (Aspöck et al., 1980).

Stadio di svernamento: prepupa. **Parassitoidi (larve):** *Hemiteles* sp., *Homocidus* sp. (Ichneumonidae), *Anacharis* spp. e *Aegilips* sp. (Anacharitidae)

Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: da 7,5 a 10 mm. (Aspöck et al., 1980).

Distribuzione regionale italiana:

Valle D'Aosta; Piemonte?; Lombardia; Trentino Alto-Adige; Veneto; Friuli Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana?; Lazio; Campania?; Puglia?; Calabria; Sicilia?; Sardegna?.

Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:

Schneider, 1845; Costa, 1855, 1884b; Costa G., 1874 (?); Della Torre, 1882; Heller & Della Torre, 1882; Hagen, 1860a; Minà-Palumbo, 1871; Marcuzzi, 1956; Aspöck, 1963a; Zangheri, 1966; Eglin-Dederding, 1967; Schmid, 1972; Aspöck et alii, 1980; Monserrat, 1980, 1994b; Pantaleoni, 1986b, 1988, 1989b, 1990a; Cocquemot et al., 1990; Minelli et al., 1993; Nicoli Aldini, 1994; Bernardi Iori et al.,

1995(?);Hellrigl et al., 1996; Pantaleoni & Letardi, 1998; Letardi et al., 2010;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](#).